



## LEEP 和 HPV

### LEEP 能否把 HPV 除掉？

LEEP 可以除去含有人類乳頭瘤狀病毒 (HPV) 的子宮頸細胞。此外，身體的免疫系統可以清除 HPV 感染。您做了 LEEP 之後要接受檢測，看看有沒有 HPV。

LEEP 手術後 HPV 檢測結果正常的婦女，在不久的將來會有進一步的高等級細胞變化(2 級或 3 級子宮頸上皮內贅瘤)的風險十分低。HPV 檢測結果不正常的婦女，會有高等級細胞變化復發的風險較高，需要接受更仔細的跟進。

### 在治療之後伴侶可能感染 HPV 嗎？

雖然大部分夫妻之間的 HPV 是同類型的，但通過性接觸再度受到感染是有可能的。

### 我曾接受與 HPV 有關的子宮頸或生殖器疾病的治療，我是否仍需要接種 HPV 疫苗？

是，即使您曾患與 HPV 有關的疾病，我們仍建議接種 HPV 疫苗。它可保護您不會感染您還未接觸到的各類型 HPV，並且減低您日後患上與 HPV 有關的疾病的可能性。過往的 HPV 感染不一定可保護您日後不會受到感染，即使感染屬同一類型。

### 聯絡我們

BC Cancer Cervix Screening  
801-686 West Broadway  
Vancouver, BC V5Z 1G1

電話：1-877-702-6566  
電郵：screening@bccancer.bc.ca  
網址：www.screeningbc.ca/cervix

您的個人資料是依照《個人資料保障法》(Personal Information Protection Act) 和《資訊自由及私隱保障法》(Freedom of Information and Protection of Privacy Act)(如適用)來收集，以及受保障不會遭到未經批准的使用和披露。這些資料只會在按照這些法例規定之下才可使用和披露，並會用於質量保證管理，以及向負責提供護理的醫護人員或在法律要求下披露。

有關卑詩癌症局(BC Cancer)收集資料的問題，可以向 Operations Director, Cancer Screening(癌症篩檢營運總監)提出(地址: 801-686 West Broadway, Vancouver BC V5Z 1G1, 網址: www.screeningbc.ca或電郵: screening@bccancer.bc.ca)。



## 電環切除手術 (LEEP)

回答有關 LEEP 的問題

## 在 LEEP 期間情況會怎樣？

如果您收到異常的陰道鏡檢查結果，您的醫護人員可能會建議您做俗稱 LEEP 的電環切除手術。

LEEP 涉及使用纖細的線圈來清除子宮頸的不正常組織。

它通常是在診斷後八星期內做。超過 90% 的婦女只需要做一次 LEEP，就可清除任何不正常的組織。

- 1 醫生將會使用一種名叫陰道鏡的專用顯微鏡來觀察您的子宮頸。
- 2 將會在子宮頸塗抹少許醋或碘酒，使異常情況更容易被看到。
- 3 然後會用局部麻醉來使子宮頸變得麻木。在進行麻醉時，有些人會感到夾痛或絞痛。麻醉藥將會令您的心跳略為加快，不過這種情況是沒有危險的，幾分鐘內就會消退。

- 4 然後會用纖細的線圈來清除不正常的組織。這項醫療程序通常需時少於五分鐘。
- 5 為減少出血，可能會在子宮頸塗抹一種棕色的膏，這些膏稍後會流出來，看上去是棕色或黑色的，這是正常的。

觀看有關 LEEP 的視頻：  
[www.screeningbc.ca/cervix](http://www.screeningbc.ca/cervix)

## 做 LEEP 有什麼風險？

做了 LEEP 之後，有些微可能性會有嚴重出血或感染。您如察覺有以下情況，請立即聯絡醫生：骨盆疼痛加劇、嚴重或長期出血、發燒或有氣味難聞的陰道分泌物。

近期的研究顯示，懷孕的能力不會受到 LEEP 影響。它會稍稍增加懷孕出現併發症的可能性，例如流產或早產。請找醫生商談，解決疑慮。

在罕見的情況下，LEEP 可能會導致子宮頸的入口處收窄，這種情況也叫做子宮頸狹窄症。

## 我若是懷孕了，做 LEEP 安全嗎？

您若是懷孕了，請通知醫生。在很多情況下，LEEP 可以在寶寶出生之後才做。

## 做了 LEEP 之後，情況會怎樣？

做了 LEEP 之後，大部分婦女都沒有症狀。您如有腹部絞痛，可使用普通的乙醯胺酚 (Tylenol®) 或布洛芬 (Advil®) 之類的止痛藥，來緩解疼痛。您可能會有腹部絞痛、輕微陰道出血或水狀陰道分泌物，這種情況會歷時幾星期。三星期不可使用衛生棉條、游泳、浸浴或性交。

此外，一星期不可提舉重物或做費力的運動。醫生將會在三星期內與您一起審視檢查結果。如果還未接到通知，請聯絡您的醫生。通常會建議在做了 LEEP 之後六個月覆診。

## 覆診

### 在覆診期間情況會怎樣？

通常您會在做了 LEEP 之後六個月接受跟進陰道鏡檢查。醫生將會採集一小片組織樣本(活組織切片檢查)，並進行檢測看看有沒有 HPV。HPV 檢測在感覺上與子宮頸抹片檢查差不多。

HPV 檢測是用來確定需不需要有更多跟進，或者您可否恢復由您的醫護人員負責的定期子宮頸抹片檢查。

### 跟進檢查結果如正常，怎麼辦？

如果您的活組織切片檢查結果和 HPV 檢測結果是正常的，您有異常情況復發的風險十分低。您應該繼續去見您的基本醫療人員，接受子宮頸篩檢(子宮頸抹片檢查)。

### 跟進檢查結果如不正常，怎麼辦？

如果在您覆診時所做的子宮頸抹片檢查顯示子宮頸有高等級的細胞變化，那麼就需要再做一次 LEEP。如果您的 HPV 檢測結果不正常但活組織切片檢查結果正常，您將繼續接受陰道鏡檢查診所監測。